

водой до исчезновения запаха хлора и высушивают.

3.14.6. *Медицинские отходы, сгустки крови и сыворотку крови* перед сбросом в общую канализационную сеть обезвреживают только с применением 1,0% раствором дезинфицирующего средства (в соответствии с действующими инструкциями по обеззараживанию). Содержимое микропробирок с разведенной сывороткой, а также содержимое планшета после инкубации с сывороткой удаляется в емкость с 1,0% раствором средства. Время экспозиции при комнатной температуре составляет 120 минут.

3.14.7. *Ватно-марлевый материал, бумажные фильтры, разовые деревянные палочки* погружают или замачивают в 2,0% растворе средства на 120 минут, затем уничтожаются путем сжигания или выбрасываются в контейнер для мусора.

3.14.8. *Банки с фекалиями, желчью, мокротой, мочой, осадками сточных вод* и т.п. в течение рабочего дня помещают в эмалированные кюветы или на отдельные столы (стационарные или передвижные с пластиковым или другим, легко поддающимся дезинфекции покрытием). Дезинфекцию проводят 1,0% раствором средства при экспозиции 240 минут или 2,0% раствором средства при экспозиции 120 минут.

3.14.9. *Биологические отходы* заливают 1,0% раствором средства в соотношении 1 : 2 и выдерживают 120 минут или 2,0% раствором средства на 60 минут, затем утилизируют.

3.14.8. *Пробы биологического материала от человека, отработанный материал санитарно-паразитологических исследований* воды, почвы, сточных вод, их осадков и т.п. заливают 2,0% раствором средства на 120 минут перед выбросом в контейнеры или сливом в общую канализационную систему.

3.14.9. *Обеззараживание (дезинвазия) почвы*, контаминированной возбудителями паразитарных болезней (цистами и ооцистами простейших, яйцами и личинками гельминтов), проводится 3,0% раствором средства при экспозиции в течение 3 суток и норме расхода раствора 4 л/м<sup>2</sup> почвы.

### 3.15. Проведение генеральных уборок

При проведении генеральных уборок средство применяют по режимам, приведенным в таблице 8, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". Генеральная уборка осуществляется с целью удаления загрязнений и снижения микробной обсемененности в помещениях организаций. Генеральная уборка функциональных помещений, палат и кабинетов проводится по графику не реже 1 раза в месяц; операционных блоков, перевязочных, родильных залов, процедурных, манипуляционных, стерилизационных – 1 раз в неделю.

Выбор режимов дезинфекции проводят по наиболее устойчивым микроорганизмам – между вирусами или грибами рода *Candida*, в туберкулезных медицинских организациях – по микобактериям туберкулеза. Генеральные уборки в палатных отделениях, врачебных кабинетах, административно-хозяйственных помещениях, отделениях и кабинетах физиотерапии и функциональной диагностики и других проводят растворами средства по режимам, рекомендованным для профилактики и борьбы с бактериальными инфекциями.

Для проведения генеральной уборки персонал должен иметь специальную одежду и средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, резиновые перчатки, резиновый фартук и др.), промаркированный уборочный инвентарь и чистые тканевые салфетки.

### 3.16. Дезинфекция объектов в организациях различного профиля

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии приведены в таблицах 3 – 7; при особо опасных инфекциях (ООИ), анаэробных инфекциях и контаминации возбудителями сибирской язвы, легионеллеза приведены в таблицах 9 – 11.